Критерии защиты населения после радиационной аварии: структура потребления пищевых продуктов и особенности формирования доз внутреннего облучения различных возрастных групп населения Российской Федерации

В.С. Репин

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Санкт-Петербург, Россия

Целью работы является оценка соответствия возможных доз внутреннего облучения населения Российской Федерации, полученных на основе современных данных о потреблении пищевых продуктов, подвергшихся аварийному радиоактивному загрязнению, дозовым критериям принятия решений об ограничении потребления пищевых продуктов. Оценки выполнены для ситуации загрязнения основных пищевых продуктов (молоко, картофель, овощи, мясо, фрукты и рыба) цезием-137 и стронцием-90 с удельной активностью 1000 Бк/кг и 100 Бк/кг, соответственно. Показано, что с учетом современных данных об уровнях потребления различных пищевых продуктов, рассчитанные дозы облучения всех возрастных групп населения не превышают дозового критерия НРБ-99/2009 – 5 мЗв при потреблении любого из перечисленных пищевых продуктов в течение первого года после аварии, как для цезия-137, так и для стронция-90. Полученные результаты могут быть использованы для обоснования временных допустимых уровней содержания цезия-137 и стронция-90 при загрязнении одного и более пищевых продуктов.

Ключевые слова: пищевые продукты, ^{137}Cs , ^{90}Sr , удельная активность, доза облучения, критерий вмешательства.

Введение

В основу обеспечения радиационной безопасности персонала и населения положены пределы доз облучения, выраженные количественно через величину эффективной дозы и величины эквивалентных доз облучения отдельных органов [1].

Радиационная безопасность населения при поступлении техногенных радионуклидов в организм с пищевыми продуктами в условиях нормальной эксплуатации источников ионизирующих излучений (ИИИ), в соответствии с НРБ-99/2009¹, обеспечивается путем установления пределов эффективной дозы и соответствующих им пределов годового поступления радионуклидов.

В условиях радиационной аварии радиационная защита в соответствии с НРБ-99/2009 обеспечивается путем установления уровней вмешательства по дозе или по удельной активности радионуклидов в пищевых продуктах.

Одной из особенностей установления пределов годового поступления в условиях нормальной эксплуатации ИИИ является расчет его величины по наибольшему дозовому коэффициенту для некоторой возрастной группы, определяемой, как «критическая группа». Предполагается, что, «защищая» критическую группу, гарантируется радиационная защита и всех остальных возрастных групп населения.

¹ Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2009 г. № 47 (зарегистрированы Минюстом России от 14.08.2009 г., регистрационный № 14534) [Sanitary Norms and Regulations SanPiN 2.6.1.2523-09 "Norms of Radiation Safety (NRB-99/2009)" approved by the Resolution of the Chief State Sanitary Doctor of the Russian Federation of 07.07.2009 No. 47 (registered by the Ministry of Justice of Russia dated 14.08.2009 registration No. 14534)]

Репин Виктор Степанович

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева.

Адрес для переписки: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 8; E-mail: v.repin@mail.ru

В нормах радиационной безопасности НРБ-99/2009 (таблицы 6.3–6.5) предусмотрены два уровня критериев принятия решений «А» и «Б». При этом, если уровень облучения, предотвращаемого защитным мероприятием не превосходит уровень «А», то нет необходимости в выполнении мер защиты, связанных с нарушением нормальной жизнедеятельности. В частности, для ^{137}Cs уровень «А» для пищевых продуктов принят равным 1000 Бк/кг, а для ^{90}Sr – 100 Бк/кг.

Доза внутреннего облучения зависит от удельной активности пищевых продуктов, возраста и структуры рациона, то есть массы основных продуктов, потребляемых в течение года.

Цель исследования – оценка соответствия возможных доз внутреннего облучения населения Российской Федерации, полученных на основе современных данных о потреблении пищевых продуктов, подвергшихся аварийному радиоактивному загрязнению, дозовым критериям принятия решений об ограничении потребления пищевых продуктов.

Такая постановка задачи является не новой. В работе [2] автор проводит аналогичную ретроспективную оценку надежности и эффективности уровней вмешательства по защите населения на различных стадиях аварии на ЧАЭС.

Материалы и методы

Оценка доз облучения выполнена для двух радиологически значимых радионуклидов: ^{137}Cs и ^{90}Sr . Данные радионуклиды различаются по метаболическим свойствам. Периоды полураспада ^{137}Cs и ^{90}Sr близки к 30 годам, но ^{137}Cs при поступлении в организм распределяется равномерно по органам и тканям и выводится из организма лиц разного возраста с периодами от 13 до 110 суток, тогда как ^{90}Sr накапливается преимущественно в костной ткани и задерживается в организме на протяжении всей жизни. В таблице 1 приведены дозовые коэффициенты k_d на 1 Бк поступления данных радионуклидов в организм, данные в публикациях МКРЗ №56 и №72 [3,4] и в основных стандартах безопасности МАГАТЭ [5].

Таблица 1

Дозовые коэффициенты k_d для ^{137}Cs и ^{90}Sr (Зв/Бк)

[Table 1]

Dose coefficients, k_d , for ^{137}Cs and ^{90}Sr (Sv / Bq)]

Возраст, лет [Age, years]	^{137}Cs	^{90}Sr
1	$1,2 \times 10^{-8}$	$7,3 \times 10^{-8}$
5	$9,6 \times 10^{-9}$	$4,7 \times 10^{-8}$
10	$1,0 \times 10^{-8}$	$6,0 \times 10^{-8}$
15	$1,3 \times 10^{-8}$	$8,0 \times 10^{-8}$
Взрослые > 20 лет [Adult]	$1,3 \times 10^{-8}$	$2,8 \times 10^{-8}$

Из таблицы 1 видно, что у каждого из названных радионуклидов наибольшие дозовые коэффициенты относятся к лицам разного возраста: для ^{137}Cs это население в возрасте 20 лет и старше, а для ^{90}Sr – подростки 15 лет.

Доза облучения за счет потребления лицами k -го возраста j -го пищевого продукта, загрязненного i -тым радионуклидом может быть рассчитана следующим образом:

$$D_{ijk} = C_{ij} \cdot k_{dik} \cdot m_{jk} \cdot t, (1)$$

где C_{ij} – удельная активность i -го радионуклида в j -ом пищевом продукте;

k_{dik} – дозовый коэффициент на 1 Бк поступления радионуклида с пищей (табл. 1), Зв/Бк;

m_{jk} – средняя масса потребления лицами k -го возраста j -го пищевого продукта, кг/сут;

t – длительность потребления загрязненного пищевого продукта, сут;

Доза облучения для лиц разного возраста, как это следует из формулы 1, зависит не только от дозового коэффициента, но и от массы потребления пищевого продукта, также зависящей от возраста.

Учет массы потребления пищевых продуктов в зависимости от возраста широко используется в дозиметрических расчетах, как в научных публикациях [6–8] и в официальных документах [9, 10], так и в методических документах¹. Так, например, при обосновании предельных уровней удельной активности радионуклидов в пищевых продуктах в международных стандартах Кодекса Алиментариус, расчеты производились из условия, что взрослые жители ежегодно потребляют суммарно 550 кг/год пищевых продуктов, а младенцы – 200 кг/год [9]. При оценке доз облучения детей после аварии на ЧАЭС производился опрос жителей с целью уточнения реальных уровней потребления молока и других продуктов детьми и взрослыми [6], в которой показано, что средние уровни потребления молока варьируются, в зависимости от возраста и пола, от 0,2 до 0,8 л/сут. Возрастные диапазоны, для которых рассчитывались уровни потребления, представлены в научных публикациях весьма разнообразно и, как правило, не соответствовали возрастным диапазонам, для которых приведены дозовые коэффициенты. Следует отметить, что пищевая корзина потребления, по данным Росстата, меняется в сторону больших или меньших уровней потребления основных продуктов. В данной работе оценка доз произведена с использованием наиболее свежих данных Росстата за 2015 год о среднедушевом годовом потреблении пищевых продуктов [11]. Однако, поскольку данные Росстата приведены для населения в целом, то одна из задач работы заключалась в том, чтобы среднестатистические данные для всего населения пересчитать на уровни потребления отдельных продуктов различными возрастными группами. Для рас-

² Оценка доз облучения детей, проживающих на территориях, радиоактивно загрязненных вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Методические рекомендации МР 2.6.1.0007-10. М., 2010. 32 с. [Assessment of radiation doses for children living in areas radioactively contaminated due to the Chernobyl accident. Methodical recommendations of the МР 2.6.1.0007-10, Moscow, 2010, 32 p.]

чета были использованы данные Республики Беларусь, представленные в работе [12]. Расчет выполнен из предположения, что рационы жителей союзного государства Россия-Беларусь близки по набору продуктов и по соотношению уровней потребления в отдельных возрастных группах. При оценке уровней потребления возрастные группы (Таблица 1) формировались, так, чтобы можно было наилучшим образом воспользоваться дозовыми коэффициентами МКРЗ [ссылка]. Результаты расчета уровней потребления в возрастных группах населения приведены в таблице 2.

Результаты и обсуждение

Цезий-137

Расчет доз облучения для цезия-137 выполнен в соответствии с формулой 1 для основных пищевых продуктов, представленных в таблице 2, для условия, что удельная активность каждого из рассмотренных пищевых продуктов равна 1000 Бк/кг, а длительностью потребления составляет 365 суток. Результаты расчета представлены в таблице 3.

Таблица 2

Потребление пищевых продуктов различными возрастными группами населения Российской Федерации (рассчитано по данным Росстата России за 2015 год [11] и данных Республики Беларусь об уровнях потребления продуктов лицами разного возраста [12]), кг/сут.

[Table 2]

Consumption of food products by different age groups of the population of the Russian Federation (calculated according to the data of the Federal State Statistics Service of Russia for 2015 [11] and data of the Republic of Belarus in [12]), kg / day.]

Возраст, лет [Age, years]	Хлебные продукты [Bread products]	Картофель [Potatoes]	Овощи и бахчевые [Vegetables and melons]	Фрукты и ягоды [Fruits and berries]	Мясо и мясопродукты [Meat and meat products]	Рыба и рыбопродукты [Fish and fish products]	Молоко и молочные продукты [Milk and dairy products]
1–4	0,140	0,098	0,146	0,206	0,107	0,056	0,533
5–9	0,186	0,139	0,222	0,232	0,149	0,063	0,572
10–14	0,232	0,169	0,256	0,296	0,203	0,066	0,601
15–19	0,272	0,168	0,276	0,267	0,241	0,063	0,704
20–29	0,275	0,167	0,288	0,200	0,243	0,058	0,822
30–39	0,260	0,158	0,273	0,195	0,233	0,058	0,728
40–49	0,242	0,149	0,255	0,190	0,220	0,058	0,648
50–59	0,208	0,129	0,222	0,177	0,156	0,054	0,596
60–69	0,208	0,129	0,222	0,177	0,156	0,054	0,596
> 69	0,208	0,129	0,222	0,177	0,156	0,054	0,596

Таблица 3

Дозы внутреннего облучения лиц разного возраста за счет потребления различных пищевых продуктов с удельной активностью ^{137}Cs 1000 Бк/кг в течение года

[Table 3]

Doses of internal exposure for different age groups of people due to consumption of various food products with the ^{137}Cs activity concentration of 1000 Bq/kg during a year]

Возраст, лет [Age, years]	Хлебные продукты [Bread products]	Картофель [Potatoes]	Овощи и бахчевые [Vegetables and melons]	Фрукты и ягоды [Fruits and berries]	Мясо и мясопродукты [Meat and meat products]	Рыба и рыбопродукты [Fish and fish products]	Молоко и молочные продукты [Milk and dairy products]
1–4	$6,13 \times 10^{-1}$	$4,29 \times 10^{-1}$	$6,39 \times 10^{-1}$	$9,02 \times 10^{-1}$	$4,69 \times 10^{-1}$	$2,45 \times 10^{-1}$	$2,33 \times 10^0$
5–9	$6,52 \times 10^{-1}$	$4,87 \times 10^{-1}$	$7,78 \times 10^{-1}$	$8,13 \times 10^{-1}$	$5,22 \times 10^{-1}$	$2,21 \times 10^{-1}$	$2,00 \times 10^0$
10–14	$8,47 \times 10^{-1}$	$6,17 \times 10^{-1}$	$9,34 \times 10^{-1}$	$1,08 \times 10^0$	$7,41 \times 10^{-1}$	$2,41 \times 10^{-1}$	$2,19 \times 10^0$
15–19	$1,29 \times 10^0$	$7,97 \times 10^{-1}$	$1,31 \times 10^0$	$1,27 \times 10^0$	$1,14 \times 10^0$	$2,99 \times 10^{-1}$	$3,34 \times 10^0$
20–29	$1,30 \times 10^0$	$7,92 \times 10^{-1}$	$1,37 \times 10^0$	$9,49 \times 10^{-1}$	$1,15 \times 10^0$	$2,75 \times 10^{-1}$	$3,90 \times 10^0$
30–39	$1,23 \times 10^0$	$7,50 \times 10^{-1}$	$1,30 \times 10^0$	$9,25 \times 10^{-1}$	$1,11 \times 10^0$	$2,75 \times 10^{-1}$	$3,45 \times 10^0$
40–49	$1,15 \times 10^0$	$7,07 \times 10^{-1}$	$1,21 \times 10^0$	$9,02 \times 10^{-1}$	$1,04 \times 10^0$	$2,75 \times 10^{-1}$	$3,07 \times 10^0$
50–59	$9,87 \times 10^{-1}$	$6,12 \times 10^{-1}$	$1,05 \times 10^0$	$8,40 \times 10^{-1}$	$7,40 \times 10^{-1}$	$2,56 \times 10^{-1}$	$2,83 \times 10^0$
60–69	$9,87 \times 10^{-1}$	$6,12 \times 10^{-1}$	$1,05 \times 10^0$	$8,40 \times 10^{-1}$	$7,40 \times 10^{-1}$	$2,56 \times 10^{-1}$	$2,83 \times 10^0$
> 69	$9,87 \times 10^{-1}$	$6,12 \times 10^{-1}$	$1,05 \times 10^0$	$8,40 \times 10^{-1}$	$7,40 \times 10^{-1}$	$2,56 \times 10^{-1}$	$2,83 \times 10^0$

Из таблицы 3 видно, что наибольший вклад в дозы облучения всех возрастных групп населения дает молоко и молочные продукты, а наименьший – рыбопродукты и картофель. Среди продуктов, формирующих наибольшие дозы у подростков можно выделить фрукты, а у лиц в возрасте от 15 до 50 лет – хлебные продукты, овощи и мясо-продукты. Максимальная дозы облучения формируется за счет молока у лиц в возрасте от 20 до 29 лет.

На рисунке 1 показано распределение доз облучения в зависимости от возраста за счет потребления молока с удельной активностью цезия-137 - 1000 Бк/кг. Характерной особенностью данного распределения является постепенный рост дозы к возрасту 20-29 лет и снижение к возрасту 50 и более лет.

Представляет интерес сравнить критерий принятия решений по удельной активности радионуклида (таблица 6.5 из НРБ-99/2009) с критерием по дозе, предотвращаемой, если вводить запрет на потребление данного продукта (таблица 6.4 из НРБ-99/2009). В таблице 6.4 НРБ-99/2009 эффективная доза за первый год, соответствующая критерию «А», принята равной 5 мЗв. Важно заметить, что в п. 6.7 НРБ-99/2009 не приводится пояснения к какой категории населения относится данная доза (населению в целом или критической группе населения), в то время как в критериях по безопасности МАГАТЭ GSG-2 [13] действующие уровни вмешательства рассчитаны по наиболее жестким зависящим от возраста дозовым коэффициентам, то есть для наиболее уязвимых лиц из населения – детей и беременных женщин.

Из таблицы 3 и рисунка 1 видно, что в качестве репрезентативного индивидуума по молоку выступают лица в возрасте 20–29 лет и при удельной активности молока 1000 Бк/кг их доза близка к 5 мЗв/год, но не превышает

Рис. 1. Дозы облучения лиц разного возраста за счет потребления молока с удельной активностью цезия-137 1000 Бк/кг

[Fig. 1. Annual doses for different age groups of people due to consumption of milk and dairy products with the ^{137}Cs activity concentration of 1000 Bq / kg]

этого значения. Что касается остальных пищевых продуктов, то за счет малых уровней их годового потребления, дозы облучения при такой же удельной активности (1000 Бк/кг) не превышают 1,5 мЗв.

Стронций-90

Аналогичные результаты расчета для случая загрязнения пищевых продуктов стронцием-90 с удельной активностью 100 Бк/кг представлены в таблице 4 и на рисунке 2.

Дозы внутреннего облучения лиц разного возраста за счет потребления в течение года различных пищевых продуктов с удельной активностью ^{90}Sr 100 Бк/кг

Таблица 4

[Table 4

Doses of internal exposure for different ages groups of people due to consumption of various food products with the ^{90}Sr activity concentration of 100 Bq/kg during a year]

Возраст, лет [Age, years]	Хлебные продукты [Bread products]	Картофель [Potatoes]	Овощи и бахчевые [Vegetables and melons]	Фрукты и ягоды [Fruits and berries]	Мясо и мясопродукты [Meat and meat products]	Рыба и рыбопродукты [Fish and fish products]	Молоко и молочные продукты [Milk and dairy products]
0–4	$3,73 \times 10^{-1}$	$2,61 \times 10^{-1}$	$3,89 \times 10^{-1}$	$5,49 \times 10^{-1}$	$2,85 \times 10^{-1}$	$1,49 \times 10^{-1}$	$1,42 \times 10^0$
5–9	$3,19 \times 10^{-1}$	$2,38 \times 10^{-1}$	$3,81 \times 10^{-1}$	$3,98 \times 10^{-1}$	$2,56 \times 10^{-1}$	$1,08 \times 10^{-1}$	$9,81 \times 10^{-1}$
10–14	$5,08 \times 10^{-1}$	$3,70 \times 10^{-1}$	$5,61 \times 10^{-1}$	$6,48 \times 10^{-1}$	$4,45 \times 10^{-1}$	$1,45 \times 10^{-1}$	$1,32 \times 10^0$
15–19	$7,94 \times 10^{-1}$	$4,91 \times 10^{-1}$	$8,06 \times 10^{-1}$	$7,80 \times 10^{-1}$	$7,04 \times 10^{-1}$	$1,84 \times 10^{-1}$	$2,06 \times 10^0$
20–29	$2,81 \times 10^{-1}$	$1,71 \times 10^{-1}$	$2,94 \times 10^{-1}$	$2,04 \times 10^{-1}$	$2,48 \times 10^{-1}$	$5,93 \times 10^{-2}$	$8,40 \times 10^{-1}$
30–39	$2,66 \times 10^{-1}$	$1,61 \times 10^{-1}$	$2,79 \times 10^{-1}$	$1,99 \times 10^{-1}$	$2,38 \times 10^{-1}$	$5,93 \times 10^{-2}$	$7,44 \times 10^{-1}$
40–49	$2,47 \times 10^{-1}$	$1,52 \times 10^{-1}$	$2,61 \times 10^{-1}$	$1,94 \times 10^{-1}$	$2,25 \times 10^{-1}$	$5,93 \times 10^{-2}$	$6,62 \times 10^{-1}$
50–59	$2,13 \times 10^{-1}$	$1,32 \times 10^{-1}$	$2,27 \times 10^{-1}$	$1,81 \times 10^{-1}$	$1,59 \times 10^{-1}$	$5,52 \times 10^{-2}$	$6,09 \times 10^{-1}$
60–69	$2,13 \times 10^{-1}$	$1,32 \times 10^{-1}$	$2,27 \times 10^{-1}$	$1,81 \times 10^{-1}$	$1,59 \times 10^{-1}$	$5,52 \times 10^{-2}$	$6,09 \times 10^{-1}$
>69	$2,13 \times 10^{-1}$	$1,32 \times 10^{-1}$	$2,27 \times 10^{-1}$	$1,81 \times 10^{-1}$	$1,59 \times 10^{-1}$	$5,52 \times 10^{-2}$	$6,09 \times 10^{-1}$

Из таблицы 4 видно, что при одной и той же удельной активности стронция-90 в пищевых продуктах максимальные дозы облучения формируются за счет молока. Вне зависимости от вида продукта максимальные дозы формируются в возрастной группе 15–19 лет, а, начиная с 20-летнего возраста, эффективные дозы снижаются в 2 раза и более.

На рисунке 2 показано распределение доз в зависимости от возраста при годовом потреблении молока с удельной активностью ^{90}Sr 100 Бк/кг. Как видно из рисунка, наибольшие дозы облучения характерны для детей и подростков, но критической группой по дозе, с учетом дозового коэффициента и массы потребления продуктов, являются лица в возрасте от 15 до 19 лет.

Рис. 2. Эффективные дозы облучения лиц разного возраста за счет потребления в течение года молока с удельной активностью ^{90}Sr 100 Бк/кг

[Fig. 2. Annual effective doses to different age groups of people due to consumption of milk and dairy products with the ^{90}Sr activity concentration of 100 Bq / kg]

Из сопоставления доз облучения, рассчитанных по критерию удельной активности с критерием принятия решений об ограничении потребления пищевых продуктов, видно, что по стронцию-90 удельная активность 100 Бк/кг обеспечивают более, чем двух-кратный запас по молоку и более, чем пяти-кратный запас по другим пищевым продуктам.

В заключение представляет интерес также сравнить критерии принятия решений по удельной активности радионуклидов в НРБ-99/2009 с действующими уровнями вмешательства (ДУВ), предложенными в общем руководстве по безопасности МАГАТЭ [13]. Значения ДУВ в руководстве МАГАТЭ по ^{137}Cs и ^{90}Sr в 2 раза больше, чем в НРБ-99/2009, и составляют 2000 Бк/кг и 200 Бк/кг, соответственно. Эти различия объясняются тем, что уровни вмешательства в НРБ-99/2009 рассчитывались исходя из уровня вмешательства 5 мЗв/год, тогда как ДУВ МАГАТЭ рассчитывались исходя из референтного уровня 10 мЗв/год.

Выводы

Современная структура потребления основных пищевых продуктов различными возрастными группами населения Российской Федерации позволяет сохранить

непротиворечивость дозового критерия и критерия по удельной активности, представленных в НРБ-99/2009 в таблицах 6.4 и 6.5 для цезия-137 и стронция-90, причем для стронция-90 имеется двух-кратный запас по удельной активности.

Непротиворечивость аварийных критериев НРБ-99/2009 сохраняется для всех возрастных групп, включая критическую группу.

При одной и той же удельной активности пищевых продуктов наибольший вклад в дозу облучения всех возрастных групп дает потребление молока. Дозы облучения за счет потребления остальных продуктов в 2–5 раз ниже.

Представленные результаты расчетов могут быть полезными при обосновании временных допустимых уровней загрязнения одного и более пищевых продуктов и критериев принятия решений в случае радиационной аварии.

Литература

1. Публикация 103 Международной Комиссии по радиационной защите / пер. с англ., под общей ред. М.Ф. Киселева, Н.К. Шандалы. - М.: Изд. ООО ПКФ «Алана», 2009. - 312 с.
2. Константинов, Ю.О. Чернобыльская авария: обоснование и реализация решений по защите населения / Ю.О. Константинов // Радиационная гигиена. - 2011. - Том 4, № 2. - С. 59-67.
3. ICRP - International Commission on Radiological Protection. Age-dependent Doses to Members of the Public from Intake of Radionuclides - Part 1. ICRP Publication 56. Ann. ICRP 20 (2), 1990.
4. ICRP - International Commission on Radiological Protection. Age-dependent Doses to Members of the Public from Intake of Radionuclides: Part 5 Compilation of Ingestion and Inhalation Dose Coefficients. ICRP Publication 72. Ann. ICRP 26 (1), 1995.
5. Радиационная защита и безопасность источников излучения: Международные основные нормы безопасности. Общие требования безопасности, часть 3. № GSR Part 3. Вена: МАГАТЭ, 2015. - 520 с.
6. Звонова, И.А. Параметры режима питания и поведения жителей Брянской области в мае 1986 г., влияющие на оценку дозы, полученной вследствие аварии на Чернобыльской АЭС / И.А. Звонова, Т.В. Жеско, А.А. Братилова // Радиационная гигиена. - 2011. - Том 4, № 2. - С. 50-58.
7. Шандала, Н.К. Нормирование и контроль содержания радионуклидов в пищевых продуктах после Чернобыльской аварии / Н.К. Шандала, М.Н. Савкин, А.В. Титов, Е.Г. Метляев; под ред. акад. Ю.А. Израэля // Радиоактивность после ядерных взрывов и аварий: труды межд. конф., Москва, 5-6 декабря 2005 г. - СПб.: Гидрометеоздат, 2006. - Т. 3. - С. 258-261.
8. Громов, А.В. Особенности оценки текущих доз облучения детей, проживающих на радиоактивно загрязненных вследствие аварии на ЧАЭС территориях / А.В. Громов, Г.Я. Брук, В.В. Кучумов, И.К. Романович // Радиационная гигиена. - 2011. - Том 4, № 1. - С. 38-44.
9. CODEX STAN 193-1995. Codex General Standard for Contaminants and Toxins In Food And Feed Adopted 1995; Revised 1997, 2006, 2008, 2009; Amended 2009, 2010).
10. SOURCES, EFFECTS AND RISKS OF IONIZING RADIATION. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. UNSCEAR 2013. Report to the General Assembly with Scientific Annexes V.I. Scientific Annex A, 2014, 321 p.
11. Потребление, пищевая и энергетическая ценность продуктов питания в домашних хозяйствах: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/# (дата обращения: 12.10.2017).

12. Рациональные нормы потребления пищевых продуктов для различных групп населения республики Беларусь: http://minzdrav.gov.by/ru/static/kultura_zdorovia/racion_pitanie (дата обращения 10.10.2017).

13. Критерии для использования при обеспечении готовности реагирования в случае ядерной или радиологической аварийной ситуации. Общее руководство по безопасности, № GSG-2, МАГАТЭ, Вена, 2012.

Поступила: 15.11.2017 г.

Репин Виктор Степанович – доктор биологических наук, руководитель отдела здоровья Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Адрес для переписки: 197101, Россия, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 8; E-mail: v.repin@niirg.ru

Для цитирования: Репин В.С. Критерии защиты населения после радиационной аварии: структура потребления пищевых продуктов и особенности формирования доз внутреннего облучения различных возрастных групп населения Российской Федерации // Радиационная гигиена. – 2018. – Т. 11, № 1. – С. 18-24. DOI: 10.21514/1998-426X-2018-11-1-18-24

Criteria for the protection of population after radiation accident: food consumption structure and peculiarities of the internal doses formation of various age groups of the population of the Russian Federation

Viktor S. Repin

Saint-Petersburg Research Institute of Radiation Hygiene after Professor P.V. Ramzaev, Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Well-Being, Saint-Petersburg, Russia

The aim of the work is to assess the compliance of the possible doses to the population of the Russian Federation, calculated on the basis of current data on the levels of food consumption with the activity concentration corresponding to the intervention «A», according to NRB-99/2009, the dose criteria for making decisions on limiting food consumption. Estimates are made for the situation of contamination of the main food products (milk, potatoes, vegetables, meat, fruits and fish) with the cesium-137 and strontium-90 activity concentration of 1000 Bq / kg and 100 Bq / kg, respectively. It is shown that, taking into account the current data on the levels of consumption of various food products, the calculated doses for all age groups of the population do not exceed the NRB-99/2009 dose criterion of 5 mSv with the consumption of any of the listed foods within the first year after the accident, as for cesium-137, and for strontium-90. The results obtained can be used to justify the temporary permissible levels of the cesium-137 and strontium-90 contamination of one or more food products.

Keywords: food products, ^{137}Cs , ^{90}Sr , activity concentration, radiation dose, intervention criterion.

References

1. ICRP. 2007. The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 103. Ann. ICRP 37 (2-4), 2007. (in Russian).
2. Konstantinov Yu.O. Chernobyl accident: rationale and realization of decisions on protection of the population. Radiatsionnaya Gygiena = Radiation Hygiene, Saint-Petersburg, 2011, Vol. 4, № 2, pp. 59-67 (in Russian).
3. ICRP, 1990. Age-dependent Doses to Members of the Public from Intake of Radionuclides - Part 1. ICRP Publication 56. Ann. ICRP 20 (2).
4. ICRP, 1995. Age-dependent Doses to Members of the Public from Intake of Radionuclides: Part 5 Compilation of Ingestion and Inhalation Dose Coefficients. ICRP Publication 72. Ann. ICRP 26 (1).
5. Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards. General Safety

Viktor S. Repin

Saint-Petersburg Research Institute of Radiation Hygiene after Professor P.V. Ramzaev.

Address for correspondence: Mira str., 8, Saint-Petersburg, 197101, Russia; E-mail: v.repin@niirg.ru

- Requirements, Part 3. № GSR Part 3. IAEA, 2015, 520 p. (in Russian).
6. Zvonova I.A. Zhesko T.V., Bratilova A.A. Parameters of the dietary pattern and behavior of the Bryansk region inhabitants in May 1986, influencing the evaluation of the dose received due to the Chernobyl accident. *Radiatsionnaya Gygiena = Radiation Hygiene*, Saint-Petersburg, 2011, Vol. 4, № 2, pp. 50-58 (in Russian).
 7. Shandala N.K., Savkin M.N., Titov A.V., Metlyayev E.G. Ed.: acad. Israel Yu.A. Standartisation and control of radionuclide content in food products after the Chernobyl accident. Radioactivity after nuclear explosions and accidents: Proceedings of the Int. Conf., Moscow, 2005 desember 5-6. Vol 3. Saint-Petersburg, 2006, Hydrometeoizdat, pp. 258-261. (in Russian).
 8. Gromov A.V., Bruk G.Ya., Kuchumov V.V., Romanovich I.K. Peculiarities of current dose assessment for children living in the territories radioactively contaminated due to the Chernobyl accident. *Radiatsionnaya Gygiena = Radiation Hygiene*, Saint-Petersburg, 2011, Vol. 4, № 1, pp. 38-44 (in Russian).
 9. CODEX STAN 193-1995. Codex General Standard for Contaminants And Toxins In Food And Feed. Adopted 1995; Revised 1997, 2006, 2008, 2009; Amended 2009, 2010).
 10. UNSCEAR. 2013. SOURCES, EFFECTS AND RISKS OF IONIZING RADIATION. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. UNSCEAR 2013. Report to the General Assembly with Scientific Annexes V.I. Scientific Annex A, 2014, 321 p.
 11. Consumption, food and energy value of food products in households. Available from: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/# (Accessed: October 12, 2017) (in Russian).
 12. Rational norms of food consumption for various groups of the population of the Republic of Belarus. Available from: http://minzdrav.gov.by/ru/static/kultura_zdorovia/racion_pitanie (Accessed: October 10, 2017) (in Russian).
 13. Criteria for Use in Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency, IAEA Safety Standards Series № GSG-2, IAEA, Vienna, 2012

Received: November 15, 2017

For correspondence: **Viktor S. Repin** – Doctor of Biological Sciences, head of healthcare department, Saint-Petersburg Research Institute of Radiation Hygiene after Professor P.V. Ramzaev, Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Well-Being (Mira str., 8, Saint-Petersburg, 197101, Russia; E-mail: v.repin@niirg.ru)

For citation: Repin V.S. Criteria for the protection of population after radiation accident: food consumption structure and peculiarities of the internal doses formation of various age groups of the population of the Russian Federation. *Radiatsionnaya gygiena = Radiation Hygiene*, 2018, Vol. 11, No. 1, pp.18-24. (In Russian) DOI: 10.21514/1998-426X-2018-11-1-18-24